



## Коронованная поганка

Чомга питается живой рыбой, рачками и моллюсками. А добывает их ныряя под воду, где держится довольно долго и проплывает до 20 метров. Редко можно вдоволь налюбоваться этой изящной птицей — минуту две она держится на поверхности воды, после чего мгновенно исчезает, оставляя на прежнем месте лишь легкие круги.

Чомги с большой ответственностью подходят к выращиванию потомства. Прежде всего, им необходимо выбрать идеального партнера. Весной на водоемах можно стать счастливым наблюдателем брачных игр этих птиц: самец и самка приближаются друг к другу, распластавшись на воде и потрясая головами, одновременно ныряют и выныривают на поверхность с пучком водорослей и клювах, подплывают вплотную друг к другу, встают вертикально и крутят головами. Завораживающее зрелище!

Гнездо чомга строит прямо па воде — это полузатопленная куча растительности, которую необходимо регулярно обновлять. На поверхности видна лишь небольшая часть гнезда, а основная спрятана под водой. На 27—29-й день из яиц, которых у чомги может быть до 6 в одной кладке, появляются малыши. Причем сразу после вылупления птенцы умеют плавать и нырять (при опасности), однако в первое время они гордо восседают на спинах родителей и не спешат спускаться па воду. Уютно устроившись под крыльями родителя, они ожидают преподношения; взрослые птицы приносят малышам мелкую рыбешку и водяных насекомых, а также перья, которые выщипывают у себя. Заглатывание перьев является регулярным и у взрослых птиц. Существует мнение, что таким образом птицы формируют в желудке перьевую подушку, которая не только предохраняет желудок от острых рыбьих костей, по и не пропускает непереваренные кости из желудка в кишечник.

Постепенно малыши начинают спускаться на воду, но в первое время держатся на ней буквально по несколько минут и возвращаются па спины родителей. Чтобы

облегчить птенцу подъем к себе па спину, птица выставляет лапу и держит ее на уровне воды.

Процесс кормления птенцов зависит от возраста отпрысков, Впервые недели после вылупления родители приносят корм в кончике клюва и предлагают его малышам. Однако по мере взросления птенца родители переходят к его обучению — теперь рыбешка подносится к молодой чомге, но не передается в воздухе, а опускается в воду прямо перед юнцом. Дальше больше: предварительно оглушенную рыбу родитель отпускает в воду перед обучающимся. Если же тот зазевался и рыбешка попыталась ускользнуть, роди гель ту г как тут подхватит ее и снова отпустит перед "носом" обучаемого, дескать, учись, раззява!

Так как питания чомг зависит от постоянного наличия открытой воды, на зимовку шипы перемешаются в южные широты. Миграции начинаются с конца августа и длятся до середины октября. Но уже в апреле можно вновь присматриваться к водоемам в поиске этих величественных пернатых.



Поганка большая, чомга (*Podiceps cristatus*)

Размер: 46-51 см

Вес: 800-1000 г

Длительность жизни: 10-15 лет

Питание: рыба, водные насекомые, ракообразные, моллюски

Местообитание: открытая вода, заросшая по краям тростником и камышами

Гнездо: размещается на воде, представляет собой плавучую платформу из отмерших частей растений

Кладка: одна в сезон, 3-4 яйца, реже до 6, высидывание длится 27-29 дней

Голос: раскатистое «кrrrrоооаа», «герrrrrr», «кэрррэррр», а также резкое «грек-грек», «кerr-уик»

Внешний вид: немного меньше утки. Птица с тонкой шеей, удлиненным, прямым клювом. Спина буровато-рыжая, живот, шея и голова белые.

В весеннем оперении на голове вырастают два темных пучка перьев, похожих на «рожки», и рыжий «воротничок» вокруг шеи. Полового диморфизма нет. У молодых птиц на щеках черно-белые полосы.

***Т.Романова***

**Источник:** Родная природа.-2009.-№11.-  
С.15-16.